

# FICHA TÉCNICA

# BYODO PLUS

## INFORMACIÓN GENERAL

Es un activador fisiológico con una doble acción, incrementa la producción y calidad de las cosechas y ayuda a potencializar la capacidad inmunológica y resistencia natural de los cultivos.

Funciona como un germinicida de amplio espectro base de yodo trivalente y cobre sistémico combinación perfecta para controlar una gran gama de enfermedades en los cultivos agrícolas.

Es selectivo ya que no daña los microorganismos nativos del suelo. Ideal para el manejo integral de plagas ya que no es corrosivo ni fitotóxico.

Mejora la eficiencia de las aplicaciones al mezclarse con bactericidas y fungicidas logrando un efecto sinérgico. Auxiliar en la recuperación de cultivos afectados por el ataque de hongos y bacterias de diversos géneros (*Fusarium spp.*, *Clavibacter spp.* y *Mycosphaerella fijiensis*).

## INSTRUCCIONES DE USO

Iniciar aplicaciones 12 días después del trasplante cada 7 días sin sobrepasar las dosis indicada. Periodo de espera 0 días entre la última aplicación y la cosecha.

## CULTIVOS

**HORTALIZAS:** Jitomate, Tomate, Papa, Chile Pimiento, Calabaza, Pepino, Sandía, Melón, Lechuga, Cebolla, Ajo, Col, Zanahoria, Piña.

**Graminias:** Maíz, Sorgo, Trigo, Caña de Azúcar, Pastos.

**Frutales:** Aguacate, Limonero, Tamarindo, Platano.

**Berries:** Fresa, Frambuesa, Zarzamora, Arandano, Agave.

## DOSIS/HA

Aplicación foliar es de 1.5- 3 ml / 1 Lt de agua.

En el caso de fungicidas de contacto recomienda manejar un pH ácido (5-6) y en sistémicos un pH cercano al neutro (6.5-7)

Foliar. En los diferentes grupos de cultivos, las aplicaciones pueden manejarse bajo los siguientes criterios:

**-Preventivo:** iniciando en etapas tempranas o en aquellas que presenten mayor riesgo de problemas fitosanitarios y continuando a lo largo del ciclo del cultivo con una frecuencia de 8 ó 15 días


**-Curativo:** comenzando en el momento en que se presenten los primeros síntomas con repeticiones cada semana o cada 3-4 días (en función de la presión de la enfermedad y las condiciones ambientales).

**-Combinando ambos.** En el caso de hortalizas se recomienda iniciar las aplicaciones cuando la planta tenga las primeras 2 ó 3 hojas verdaderas y continuar aplicando cada 8 ó 15 días.

## COMPATIBILIDAD DE BYODO PLUS

Puede mezclarse con fertilizantes foliares e insecticidas. Se sugiere que los productos convencionales se manejen en las dosis bajas recomendadas por el fabricante así como que se realicen pruebas previas de compatibilidad de la mezcla y del comportamiento de impacto al cultivo. **NO SE RECOMIENDA APLICARLO EN COMBINACION DE PRODUCTOS HORMONALES.**

PRESENTACION:  
1 Lt.



## CONTENIDO

ANÁLISIS GARANTIZADO	%PESO
Iodo libre (Equivalente a 8.4gr de iodo libre/Lt)	0.84%
Sulfato de cobre pentahidratado (Equivalente a 5.5% de cobre metálico)	20.00%
Surfactante	10.00%
Vehículo	69.16%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

